


$$\log_{10} 100 = \boxed{2}$$

ii) $n-1 \geq 0 \Rightarrow n \geq 1 \quad \checkmark$

هر دو پایه ضربه باشد تا برابر شوند

$$\left. \begin{aligned} |y| &= \sqrt{n-1} \\ \text{همواره نا منتهی} \end{aligned} \right\} \text{همواره باقی است}$$


خط عمودی نمودار این رابطه را
در هر نقطه قطع کرد پس تابع نیست.

از روی هر درازانه دقیقاً مقدار برای وجود دارد پس این را به تابع حرکت برای آنکه عضو

بیش از یک جواب دارد پس تابع $y = -1$ و $|y-1| = 2 \Rightarrow |y-1| = \sqrt{4-2} \Rightarrow |y-1| = 4 \Rightarrow y = 5$ مثلث (الف)

بیش از یک جواب دارد پس تابع نیست.

$$y^0 - y = 0 \Rightarrow y(y-1) = 0 \Rightarrow y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



مثال نقی (ب)








بیش از یک جواب دارد یا نه؟ $\Rightarrow \cos \frac{y}{r} = 1 \Rightarrow y = \sqrt{40, 370}$ مثال نقیض (ج)

لیس از یک جراب در پس تابع شیب . $\Rightarrow$ وقتی Δ صفر باشد یا منفی می تواند باشد $= 0$ مثال نقص اد

بیش از یک جواب دارد صحیح نیست. $\times$ $y = -\frac{3}{5} \Rightarrow y-1 = -\frac{8}{5} \Rightarrow |y-1| = \frac{8}{5} \Rightarrow x=2 \Rightarrow$ مثال من (الف)

تابع هدف ۱ $\Rightarrow$ چون توان از فرمول است تطبیق مقدار را $\sqrt{-371}$ $y^0 = -371$ (ب)



الف) 	ب) 	ج) 	د) 	۶
الف) 	ب) 	ج) 	د) 	۷
				۸
				۹
الف) $-\frac{1}{2}$	ب) $\frac{1}{2}$	ج) $\frac{1}{2}$	د) $-\frac{1}{2}$	۱۰