

$$F - \frac{1}{x^r} \geq 0 \rightarrow \left(r - \frac{1}{x}\right) \left(r + \frac{1}{x}\right) = 0$$

$x=r \qquad x=-r$

$$\frac{+}{-} \frac{+}{-} \frac{+}{-} \rightarrow D_f = \left(-\infty, -\frac{1}{r}\right] \cup \left[\frac{1}{r}, +\infty\right)$$

$$mx^r + kmx + l \geq 0 \rightarrow \textcircled{1} m > 0$$

$$\textcircled{2} \Delta \leq 0$$

$$Fm^r - Fm \leq 0 \rightarrow Fm(m-1) \leq 0 \rightarrow \frac{+}{-} \frac{-}{-} \frac{+}{+}$$

1/8

$$f\left(\frac{1}{r}\right) = r+k \quad g\left(\frac{1}{r}\right) = r \rightarrow r+k=r$$

$$rx - 1 \neq 0 \rightarrow x + \frac{1}{r} = \alpha \rightarrow k=0$$

$$\alpha + k = \frac{1}{r}$$

$$f(1) = g(1) \quad \frac{9-f}{r+r} = r+b \rightarrow \frac{a}{a} = r+b$$

$$1 = r+b \rightarrow b = -r$$

$$f\left(\frac{-r}{r}\right) = g\left(\frac{-r}{r}\right) \rightarrow -ra + r = -f \rightarrow -ra = -9 \rightarrow a = r$$

$$a - b = \frac{a}{x} \quad a - b = r - (-r) = a$$

$$f(r) = g(r) \rightarrow ra^r + ra = f \rightarrow a^r - a - r = 0$$

$$(a+r)(a-1) = 0 \rightarrow a = \textcircled{-r}, \textcircled{1}$$

$$x=r \rightarrow ra^r + ra = f \rightarrow a^r + a - r = 0 \rightarrow a = 1$$

ا حسب الهمم دعت B

$$x=a \quad a^r + ra = a^r - f$$

$$\alpha = -r$$

19, 5-1

$$f(r) = r \rightarrow \frac{r+\alpha}{r-b} = r \rightarrow r+\alpha = r - rb =$$

$$\alpha = 1+r = 11 \quad g(r) = r \rightarrow r+b = r$$

$$f(1) = \frac{4+11}{r+1} = \textcircled{r} \quad b = -1$$

$$x=-1 \quad r - \alpha + b = 0 \quad \begin{cases} b - \alpha = -r \\ b + r\alpha = -r \end{cases}$$

$$x=r \quad r + r\alpha + b = 0$$

$$\alpha a = -r \rightarrow a = -r \rightarrow b = -1$$

$$f(1) \rightarrow \frac{r+1}{r-9-1} = \frac{-a}{1r}$$

$$f(x) = \frac{x^r \sqrt{r}}{x^r + ax + b} \quad -f(x+1)^r = -\varepsilon x^r - \lambda x - f$$

$$\alpha + b = \textcircled{-1r}$$

$$(x-1)^r = x^r + 1 - rx$$

$$\frac{m^r - f}{r} < 0 \rightarrow -\frac{r}{m} < r$$

۷- باید درست باشد  $\Delta \leq 0$  و  $a > 0$  را همزمان داشته باشد!

$$\Delta \leq 0 \rightarrow (-2m)^2 - 4(m)(1) \leq 0 \rightarrow 4m^2 - 4m \leq 0 \rightarrow 4m(m-1) \leq 0$$

$$a > 0 \rightarrow m > 0 \quad \text{و} \quad 1 \geq m \geq 0$$

اگر  $m = 0$  باشد تابع به صورت تابع ثابت خواهد بود و دامنه تابع نیز  $\mathbb{R}$  است پس  $m = 0$  نیز قابل قبول است!  $\leftarrow$

$$\boxed{0 \leq m \leq 1}$$