

$$x^2 - 10x + 21 = 0 \rightarrow (x-7)(x-3) = 0$$
 حل بر روش انکسار  
 معادله  $x^2 - 10x + 21 = 0$  و معادلات  $x^2 - 10x + 21 = 0$  و  $x^2 - 10x + 21 = 0$

به نام کبود جا، فرموله‌ها را فقط ابار نوشتیم ← برای معادلات درجه دوم  $ax^2+bx+c=0$   $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$  است

الف)  $-3x^2 + 5x - 1 = 0$   $a=-3, b=5, c=-1$  جای گذاری  $x = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 4(-3)(-1)}}{2(-3)} = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{-6}$   $x = \frac{-5 + \sqrt{13}}{-6}$   $x = \frac{-5 - \sqrt{13}}{-6}$

ب)  $2x^2 - x + 2 = 0$   $a=2, b=-1, c=2$  جای گذاری  $x = \frac{+1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)} = \frac{1 \pm \sqrt{1-16}}{4}$  این معادله فاقد ریشه حقیقی است، زیرا دلتا منفی است.

پ)  $2x^2 - 4x + 2 = 0$   $a=2, b=-4, c=2$  جای گذاری  $x = \frac{+4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)} \Rightarrow x = \frac{4 \pm 0}{4} = 1$  این معادله فاقد ریشه حقیقی است، زیرا دلتا منفی است.

ت)  $2x^2 - x + 1 = 0$   $a=2, b=-1, c=1$  جای گذاری  $x = \frac{+1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(2)(1)}}{2(2)}$  این معادله فاقد ریشه حقیقی است، زیرا دلتا منفی است.

\* می‌دانیم که در فرمول دلتا  $b^2-4ac = 16$  است  $\sqrt{b^2-4ac} = \sqrt{16} = 4$

الف) این در صورتی ممکن است که حاصل دلتا عددی مثبت باشد یعنی:  $2$  طرفین را بتوانیم  $\sqrt{(-3)^2 - 4(a)(2)} > 0 \rightarrow \sqrt{9 - 8a} > 0 \rightarrow 9 - 8a > 0 \rightarrow 9 > 8a \Rightarrow a < \frac{9}{8}$


ب) این در صورتی امکان پذیر است که حاصل دلتا عددی صفر باشد یعنی:  $2$  طرفین را بتوانیم  $\sqrt{(-3)^2 - 4(a)(2)} = 0 \rightarrow \sqrt{9 - 8a} = 0 \rightarrow 9 - 8a = 0 \rightarrow 9 = 8a \Rightarrow a = \frac{9}{8}$

پ) این در صورتی امکان پذیر است که حاصل دلتا عددی منفی باشد یعنی:  $2$  طرفین را بتوانیم  $\sqrt{(-3)^2 - 4(a)(2)} < 0 \rightarrow \sqrt{9 - 8a} < 0 \rightarrow 9 - 8a < 0 \rightarrow 9 < 8a \rightarrow a > \frac{9}{8}$


ت) این در صورتی ممکن است که حاصل دلتا عددی منفی باشد (یا صفر یا مثبت) یعنی:  $2$  طرفین را بتوانیم  $\sqrt{(-3)^2 - 4(a)(2)} \geq 0 \rightarrow \sqrt{9 - 8a} \geq 0 \rightarrow 9 - 8a \geq 0 \rightarrow 9 \geq 8a \rightarrow a \leq \frac{9}{8}$

باقیه به سببی  $y = x^2 + 6x + 5$  داریم:  $\leftarrow$  بطور خلاصه: الف)  $\min | -\frac{3}{4} |$  (با یخ‌خانی)

الف) چون ریشه‌های دوم به فرم  $y = ax^2 + bx + c$  عددی مثبت است  $(a > 0)$  سهمی منبسط دارد است؛ طول افق اکسترم با فرمول  $(\frac{-b}{2a})$  بدست می‌آید و چون  $a = +1$  و  $b = +6$  است  $\leftarrow$  طول اکسترم:  $\frac{-6}{2} = -3$  بدست می‌آید؛ عرض اکسترم را با جایگذاری طول آن در معادله بدست آوریم  $\leftarrow y = -3 \leftarrow y = (-\frac{6}{2})^2 + 6(-\frac{6}{2}) + 5 = -5$  است.

ب) با توجه به قیمت اکسترم سهمی  $\min | -\frac{3}{4} |$  و اینکه سهمی منبسط دارد است؛   $\min | -\frac{3}{4} |$  (نقطه اکسترم)

الف) چون ریشه‌های دوم به فرم  $y = ax^2 + bx + c$   $a = -1$ ،  $b = +4$ ،  $c = -3$  است و عدد منفی  $(a < 0)$  پس سهمی ماکسیم دارد است. طول سهمی از رابطه  $\frac{-b}{2a}$  بدست می‌آید  $\leftarrow$  است  $y = \frac{+4}{2(-1)} = -2$  است و عرض اکسترم از طریق جایگذاری طول آن در معادله بدست می‌آید؛

$y = -(\frac{4}{2})^2 + 4(\frac{4}{2}) - 3 = 1 \Rightarrow \max | 1 |$    $\max | 1 |$   $\rightarrow x = 1$  و  $x = 3$

ب) با نسبت در معادله  $y$  را با بدست قرار دهیم و ریشه‌های آن را بدست آوریم (ریشه‌های آن که منفی محور ها را قطع می‌کند) (برای دلتا قابل گرفتن)  $-x^2 + 4x - 3 = 0$   $a=-1, b=4, c=-3$   $x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4(-1)(-3)}}{2(-1)} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{-2} = \frac{-4 \pm 2}{-2}$   $x = \frac{-4+2}{-2} = 1$  و  $x = \frac{-4-2}{-2} = 3$

انتگرال  $S$  و  $P$  را بدست می‌آوریم: در معادله  $x^2 - 3x - 2 = 0$  به فرم کلی  $(-b \pm \sqrt{b^2-4ac})$   $\rightarrow$  فرمول دلتا  $S = \frac{-b}{a} = \frac{-(-3)}{(1)} = 3$  و  $P = \frac{c}{a} = \frac{-2}{1} = -2 \Rightarrow \begin{cases} S = 3 \\ P = -2 \end{cases}$   $a=1, b=-3, c=-2$  است

الف) جایگذاری می‌کنیم:  $S^2 - 2P = (3)^2 - 2(-2) = 9 + 4 = 13$

ب) با جایگذاری بدست داریم:  $S^3 - 3SP = (3)^3 - 3(3)(-2) = 27 + 18 = 45$