

نام و نام خانوادگی: ... پاسخنامه تشریحی تکلیف شماره ۴ ... کلاس: ...

$$2f(5) = 2(a+1)(5+2) = 14(a+1) = 14a+14$$

$$f(-2)+a = 3a-4+a = 4a-4$$

$$2f(5) = f(-2)+a \rightarrow 14a+14 = 4a-4 \rightarrow 10a = -18 \rightarrow a = \frac{-18}{10} = \frac{-9}{5}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 2 \quad ; \quad f(2-\sqrt{3}) + f(2+\sqrt{3}) = \sqrt{9} + \sqrt{9} + 4 = 4 + 2\sqrt{9}$$

$$\rightarrow f(2-\sqrt{3}) = \sqrt{2-\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} + 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \sqrt{2-\sqrt{3}}, B = \sqrt{2+\sqrt{3}} \\ AB = \sqrt{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4-3} = 1 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow f(2+\sqrt{3}) = \sqrt{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} + 2 \quad \left\{ \begin{array}{l} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \\ \frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{A+B}{AB} = A+B = \sqrt{9} \end{array} \right.$$

$$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB \rightarrow 2 - \sqrt{3} + 2 + \sqrt{3} + 2 = 9 \rightarrow A+B = \sqrt{9} \quad \left| \quad \frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{A+B}{AB} = A+B = \sqrt{9} \right.$$

$$\begin{array}{l} 2f(x) - 3f(-x) = 4x^2 - 2x \quad \left\{ \begin{array}{l} \times 2 \rightarrow 4f(x) - 6f(-x) = 8x^2 - 4x \\ \times 3 \rightarrow -9f(x) + 6f(-x) = -12x^2 + 6x \end{array} \right. \\ 2f(-x) - 3f(x) = 4x^2 + 2x \quad \left\{ \begin{array}{l} \times 2 \rightarrow -4f(x) + 6f(-x) = 8x^2 + 4x \\ \times 3 \rightarrow -9f(x) + 6f(-x) = -12x^2 + 6x \end{array} \right. \end{array}$$

$$\rightarrow -5f(x) = 20x^2 + 2x \rightarrow f(x) = -4x^2 - \frac{x}{5}$$

$$(x+2)f(x) - 2xf(x+2) = 4x^2 - mx + m - 1$$

$$\begin{array}{l} x \rightarrow 2f(0) - 0 = 2m - 1 \rightarrow f(0) = \frac{2m-1}{2} \\ x \rightarrow 4f(0) = 4m + 4 \rightarrow f(0) = \frac{4m+4}{4} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{2m-1}{2} = \frac{4m+4}{4} \times 2 \rightarrow 2m-1 = 4m+4 \\ 2m = 5 \rightarrow m = \frac{5}{2} \end{array} \right.$$

$$f(0) = \frac{2m-1}{2} = \frac{2(\frac{5}{2})-1}{2} = \frac{5-1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3x^2 - 12x + 3}{x} \div x \rightarrow 3x - 12 + \frac{3}{x}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$ax+b \quad \frac{a}{x}+b$$

$$ax+b+\frac{a}{x}+b = ax+\frac{a}{x}+2b \quad \left\{ \begin{array}{l} ax+\frac{a}{x}+2b = 3x+\frac{3}{x}-12 \rightarrow a=3 \\ b=-9 \end{array} \right.$$

$$f(x) = 3x-9 \rightarrow f(-1) = -3-9 = -12$$

$$f(x) = (x-1)\sqrt{1-x} \rightarrow 1-x \geq 0 \rightarrow x \leq 1$$

$$g(x) = -\sqrt{(1-x)^3} \rightarrow (1-x)^3 \geq 0 \rightarrow 1-x \geq 0 \rightarrow x \leq 1$$

$$D_f = (-\infty, 1]$$

$$D_g = (-\infty, 1]$$

فناپذیر دافنه‌ها برابر هستند پس توابع مساوی اند. ✓

۶

$$f(x) = x\sqrt{x} \rightarrow x \geq 0 \rightarrow D_f = [0, +\infty)$$

$$g(x) = \sqrt{x^3} \rightarrow x^3 \geq 0 \rightarrow x \geq 0 \rightarrow D_g = [0, +\infty)$$

فناپذیر دافنه‌ها برابرند پس توابع مساوی اند. ✓

۷

$$f(x) = [\sqrt{x} - \lfloor \sqrt{x} \rfloor] \rightarrow x \geq 0 \rightarrow D_f = [0, +\infty)$$

$$g(x) = \sqrt{x - |x|} \rightarrow x - |x| \geq 0 \rightarrow x \geq |x| \rightarrow D = [0, +\infty)$$

فناپذیر دافنه‌ها برابرند پس توابع مساوی اند. ✓

۸

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (0, 0)\}, g = \{(-1, 1), (1, 1), (2, 3), (3, 5), (0, 2), (\sqrt{7}, 1)\}$$

$$\text{الف) } \left(\frac{f+g}{f-g}\right)(1) \rightarrow f(1)=2, g(1)=1 \rightarrow \frac{2+1}{2-1} = 3$$

$$\text{ب) } \left(\frac{f+g}{f-g}\right)(2) \rightarrow f(2)=3, g(2)=3 \rightarrow \frac{3+3}{3-3} = \frac{6}{0} \text{ تعریف نشده}$$

$$\text{ج) } f(0)g(-1) \rightarrow f(0)=0, g(-1)=1 \rightarrow 0 \times 1 = 0$$

۹

$$f(x) = \{(2, 1), (-1, 4), (0, 5), (-2, 2), (3, -1)\}$$

$$\text{الف) } g(x) = f(3x-1) \rightarrow 3x-1 = -2 \rightarrow x = -\frac{1}{3} \mid 3x-1 = -1 \rightarrow x = 0 \mid 3x-1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$3x-1 = 2 \rightarrow x = 1 \mid 3x-1 = 3 \rightarrow x = \frac{4}{3} \rightarrow g = \left\{(-\frac{1}{3}, 2), (0, 4), (\frac{1}{3}, 5), (\frac{4}{3}, -1)\right\}$$

۱۰

$$\text{ب) } h(x) = f(|x|) \rightarrow |x| = 0 \rightarrow x = 0 \mid |x| = 2 \rightarrow x = \pm 2 \mid |x| = 3 \rightarrow x = \pm 3$$

$$|x| \geq 0 \mid h = \{(0, 5), (2, 1), (-2, 1), (3, -1), (-3, -1)\}$$