

۲. از هفتای دبی مرتب ننویس
مرتبه مرتب!

$$1 \sum (a+1)(v) = 1u - 1 + a$$

$$1 \sum a + 1 \sum = 1u - 1$$

$$1 \sum a = -1$$

$$1 \sum a + 1 \sum = \sum a - \sum$$

$$1 \sum a = -1$$

$$a = \frac{-1}{1}$$

$$1 \sum a + 1 \sum = 1u - 1$$

$$1 \sum a + 1 \sum = 1u - 1$$

$$f(1-\sqrt{2}) + f\left(\frac{1}{1-\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$$

$$(n+y)^2 = 1-\sqrt{2} + 1+\sqrt{2} + 1 = 3$$

$$1 \sum f(n) - 1 \sum f(-n) = \sum n^2 - 1$$

$$9 \sum f(-n) - 1 \sum f(n) = \sum n^2 + 1$$

$$1 \sum f(n) - 9 \sum f(n) = 1 \sum n^2 + 1$$

$$-8 \sum f(n) = 1 \sum n^2 + 1$$

$$f(n) = \frac{1 \sum n^2 + 1}{-8}$$

B



Date:

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

~~و حَتَّىٰ لَا يَخْرُجَ إِلَيْكَ الْكُفْرَ = كَيْفِي أَوْ كَسْرَ أَوْ~~
~~حَرْفَ أَوْ = كَيْفِي أَوْ وَبِشْرَ أَوْ~~

(15)

$$\Rightarrow 4f(0) = 19 + r_m + r_m +$$

$$q f(0) = 10 + 2m$$

$$1 \wedge f(0) = \Sigma \omega + 10m$$

$$-1 \cdot f(1) = +20 - 10m$$

$$P(0) = P_m - 1$$

$$\wedge f(0) = \omega.$$

c) $f(\cdot) = \frac{\omega}{\lambda} \cdot \left(\frac{\lambda \omega}{\varepsilon} \right)$

$$x = -1$$

$$f(-1) + f(-1) = \frac{1^2 + 1^2 + 1^2}{-1} = -1$$

$$f(-1) = -9$$

$$1 - n \geq 0$$

$$1 \geq n \quad \text{I}$$

را صد کا پیر

$$\frac{1-u \geq 0}{1 \geq u} \quad \text{I}$$

سازمان جبهه علم مبارز

$$V \Rightarrow f(n) = g(n)$$

$n \geq 1$ از عدد ۱ شروع می‌کنیم (✓)
 $n \geq 2$ چند عدد دیگر $f(n) = g(n)$

(✓)

$g(n)$ در $n \geq 0$

از ۰ شروع می‌کنیم

$f(n)$ در $n \geq 0$

$f(n) = g(n)$

$f(1) = 2$ از ۱ (۹)
 $g(1) = 2$ از ۱

$f(1) = 2$
 $g(1) = 2$

$\frac{p+1}{p-1}$ (۱۳)

$f(1) = 2$

$g(1) = 2$

$g - f = 2 - 2 = 0$ تفاوت ۰

(۱۳)

$f(1) = 2 \Rightarrow f(1) + g(1) = 4$

11

۱۲۳

$$h(u) = \{ (r, 1), (-r, 1), (0, \bar{\omega}), (r, -1), (-r, -1) \}$$